

**PL**
Impiela pigmentación de los dientes que pudiera producirse tras el relleno de un canal sin lavar.

- PRZĘDZUCIE NALEŻY ZAPÓZNAC SIĘ Z PONÍŻSZĄ INSTRUKCJĄ WYRÓB DO UŻYCIANIA WYŁĄCZAJĄC PRZEZ LEKARZA STOMATOLOGA**

SKŁAD: podchloryn sodu (zawartość czynnego chloru 2%), woda o czystości farmakopelajnej.

**PRZECIWNZANIJE**

Podczas mechanicznego poszerzania kanału usuwa resztki martwej miąższ. Czyszczy kanał, łącznie z usuwaniem wosgotwby następuje, aby odłóżnik usjąca się woda i diglicjanat sodu nie zaciemniał kanału. Zapobiega przebarwianiom zębów, które mogłyby wystąpić po wypełnieniu nie wypuklanego kanału.

1. Zakreślić zakres do pobierania preparatu do strzykawki

- Odkręć zakretek butelki.
- Zakreć adapter na butelce.
- W celu użycia usun niewielką zakretekę, wkreć koniec strzykawki w otwór adaptera, przeczyl butelkę z preparatem dnem do góry i nabierz płyn do strzykawki, przyczmyżując jednocześnie adapter. Następnie ustaw butelkę na białcie w pozycji pionowej i delikatnie wykręć strzykawkę z piwnę z adaptera. Zaleca się stosować strzykawkę luer-lock z gumowym tłokiem.
- Po każdym użyciu zabezpiecz adapter niewielką zakretką.
- Do transportu usun adapter i zakreć butelkę zakretką.

**SPÓSÓB UŻYCIA**
CHLORAXID 2% wprowadzić do kanału za pomocą strzykawki z igłą z bocznym otworem. Płukać kanały oficje, w ilości około 10 ml płynu na 1 kanał. Znajdujący się w wyrobie podchloryn sodu podczas kontaktu z substancją organiczną ulega natychmiastowej inaktywacji. Wraz z zmniejszaniem stężenia podchloryn sodu należy jednocześnie wydłuzć czyn przepływającą oraz zwiększyć objętość czynnego roztworu.

**PRZECIWNZAKAZANIA**

Nie stosować wyrobu CHLORAXID 2% u pacjentów z nadwrażliwością na składniki preparatu.
**UWAGA!** Podczas przepływania kanałów korzeniowych, pomiędzy płukaniem Beber grandes cantidades de agua. Consultar a un médico. A la hora de trabajar el producto es obligatorio usar un dique dental. Asimismo, deben utilizarse medidas de protección individual (gafas, mascarilla de protección, guantes).
**EL DOSIFICADOR NO SIRVE PARA EL UMBLACIAMIENTO DE LIQUIDOS!**
In caso de un incidente serio asociado a un dispositivo, informar al fabricante y a la autoridad competente del país donde el usuario o el paciente tiene su domicilio.

**MEDIDAS DE SEGURIDAD**
A la hora de enjuagar el canal radicalar, no emplear un chorro demasiado fuerte del líquido, ya que esto puede provocar la introducción del líquido en los tejidos circundantes dañándolos, lo cual se traduce en la aparición o hinchazón de los tejidos blandos. Tener un cuidado especial al emplear el producto en perforaciones. Irrita las mucosas bucales, los ojos y la piel. En caso de contacto, enjuagar los ojos con grandes cantidades de agua y consultar a un médico. En caso de ingestión no inducir vomitos. Beber grandes cantidades de agua. Consultar a un médico. A la hora de trabajar el producto es obligatorio usar un dique dental. Asimismo, deben utilizarse medidas de protección individual (gafas, mascarilla de protección, guantes).

**PREVENCIÓN DE ACCIDENTES**
**EL DOSIFICADOR NO SIRVE PARA EL UMBLACIAMIENTO DE LIQUIDOS!**
In caso de un incidente serio asociado a un dispositivo, informar al fabricante y a la autoridad competente del país donde el usuario o el paciente tiene su domicilio.

**ALMACENAMIENTO**
Guardar en embalajes originales a una temperatura de 2 a 8 °C (en la nevera). Guardar en un embalaje hermético. Proteger contra la radiación solar. Guardar fuera del alcance de los niños. La fecha de caducidad se encuentra en el envase directo del producto.

**ALMACENAMIENTO**
Guardar en embalajes originales a una temperatura de 2 a 8 °C (en la nevera). Guardar en un embalaje hermético. Proteger contra la radiación solar. Guardar fuera del alcance de los niños. La fecha de caducidad se encuentra en el envase directo del producto.

**ALMACENAMIENTO**
Guardar en embalajes originales a una temperatura de 2 a 8 °C (en la nevera). Guardar en un embalaje hermético. Proteger contra la radiación solar. Guardar fuera del alcance de los niños. La fecha de caducidad se encuentra en el envase directo del producto.

**ALMACENAMIENTO**
Guardar en embalajes originales a una temperatura de 2 a 8 °C (en la nevera). Guardar en un embalaje hermético. Proteger contra la radiación solar. Guardar fuera del alcance de los niños. La fecha de caducidad se encuentra en el envase directo del producto.

**TRANSPORTE**
El fabricante admite el transporte del producto durante un plazo máximo de 10 días a la temperatura superior a 40°C. El transporte breve manteniendo el rango de temperaturas mencionado no afecta a la seguridad y eficacia del producto a lo largo de toda su vida útil.

**PRZECIWNOWYMIENIE**
Przechowywać w oryginalnych opakowaniach w temperaturze 2-8°C (w lodówce). Przechowywać w opakowaniu szczelnie zamkniętym. Chronić przed działaniem promieni słonecznych. Przechowywać w miejscu niedostępnym dla dzieci. Termin przydatności znajduje się na opakowaniu bezpośrednio. Po otwarciu opakowania okres ważności nie ulega zmianie pod warunkiem szczelnego zamknięcia po każdorazowym użyciu.

**TRANSPORT**
Wytwórca dopuszcza transport wyrobu przez okres nie dłuższy niż 10 dni w temperaturze nie przekraczającej 40°C. Krótkotrwały transport w podanych zakresach temperatur nie wpływa na bezpieczeństwo i skuteczność działania wyrobu przez cały okres przydatności wyrobu do użycia.

**POSTĘPOWANIE Z OPAKOWANIAMI PO WYROBIE**
Usytę opakowanie należy przekazać do utylizacji lub zwrócić do wytwórcy.

**DODATKOWE OPAKOWANIE**
Butelka zawierająca 200 g lub 400 g preparatu, adapter z zakretką, dozownik.

Data ostatniej aktualizacji: 08.06.2021/9

EN
<p><b>PLEASE READ THE FOLLOWING INSTRUCTIONS BEFORE USE</b> <b>PRODUCT FOR DENTAL USE ONLY</b></p> <p><b>COMPOSITION:</b> sodium hypochlorite (2% of active chlorine), water Ph. Eur.</p> <p><b>INTENDED USE</b> During the mechanical canal widening it removes the remains of dead pulp. It cleans the canal and removes the smear layer to expose the dentin root canal in a wide opening. Rinse the canals copiously, approximately 10 ml for one canal. It prevents discoloration of the teeth that might occur after filling the non-rinsed root canal. <b>Adapter with a plug for taking the liquid preparations into the syringe</b> 1. Unscrew the bottle cap. 2. Screw the adapter on the bottle. 3. In order to use the bottle, remove the blue plug, screw the end of the syringe into the adapter opening, tilt the bottle with the preparation upside down and take the liquid into the syringe, while simultaneously holding down the adapter. Next, put the bottle upright on the table and immediately unscrew the filled syringe from adapter. It is recommended to use luer-lock syringes with a rubber plunger. 4. After each use, close the adapter opening with a blue plug. 5. For transport, remove the adapter and screw the cap on the bottle.</p>

**INSTRUCȚIUNI PENTRU ÎNTREREA ÎN CANAL**
Introduceți în canalul rădăcinii cu ajutorul seringii cu o seringă cu o deschidere laterală. Clătiți canalul copios, aproximativ 10 ml pe un canal. Sodiu hipoclorit conținut în produs inactivă imediat în contact cu substanță organică.
**ATENȚIUNE!** La ora de rinșare des canalea radiaclare, evitați utilizarea de hipoclorit de sodiu și de digliconate de clorhexidine, aplicați o soluție fiziologică pentru a preveni precipitarea d'un depozit brun. Rincer abundențment.

**PRECAȚIUNI**
Nu folosiți produsul CHLORAXID 2% pentru pacienți cu hipersensibilitate la componentele produsului.

**CONTRAINDICAȚIUNI**
Nu dozează produsul CHLORAXID 2% în țesuturile periapicale și în țesuturile moi.
**CAȚION!** White rinsing root canals. use physiological saline between rinsing with sodium hypochlorite and chlorhexidine digluconate. It prevents the precipitation of a brown deposit.
Rincer copios.

**PREVENIȚIUNI**
În timpul preparării canalului rădăcinii nu utilizați un curent de aer puternic deoarece poate provoca iritații ale țesuturilor periapicale și poate provoca umflarea țesuturilor moi.
**ATENȚIUNE!** În timpul preparării canalea radiaclare, evitați utilizarea de hipoclorit de sodiu și de digliconate de clorhexidine, aplicați o soluție fiziologică pentru a preveni precipitarea d'un depozit brun. Rincer abundențment.

**PREVENIȚIUNI**
În timpul preparării canalului rădăcinii nu utilizați un curent de aer puternic deoarece poate provoca iritații ale țesuturilor periapicale și poate provoca umflarea țesuturilor moi.

**CONTRAINDICAȚIUNI**
Nu dozează produsul CHLORAXID 2% în țesuturile periapicale și în țesuturile moi.
**CAȚION!** White rinsing root canals. use physiological saline between rinsing with sodium hypochlorite and chlorhexidine digluconate. It prevents the precipitation of a brown deposit.
Rincer copios.

**CONTRAINDICAȚIUNI**
Nu dozează produsul CHLORAXID 2% în țesuturile periapicale și în țesuturile moi.
**CAȚION!** White rinsing root canals. use physiological saline between rinsing with sodium hypochlorite and chlorhexidine digluconate. It prevents the precipitation of a brown deposit.
Rincer copios.

**CONTRAINDICAȚIUNI**
Nu dozează produsul CHLORAXID 2% în țesuturile periapicale și în țesuturile moi.
**CAȚION!** White rinsing root canals. use physiological saline between rinsing with sodium hypochlorite and chlorhexidine digluconate. It prevents the precipitation of a brown deposit.
Rincer copios.

**CONTRAINDICAȚIUNI**
Nu dozează produsul CHLORAXID 2% în țesuturile periapicale și în țesuturile moi.
**CAȚION!** White rinsing root canals. use physiological saline between rinsing with sodium hypochlorite and chlorhexidine digluconate. It prevents the precipitation of a brown deposit.
Rincer copios.

**CONTRAINDICAȚIUNI**
Nu dozează produsul CHLORAXID 2% în țesuturile periapicale și în țesuturile moi.
**CAȚION!** White rinsing root canals. use physiological saline between rinsing with sodium hypochlorite and chlorhexidine digluconate. It prevents the precipitation of a brown deposit.
Rincer copios.

**CONTRAINDICAȚIUNI**
Nu dozează produsul CHLORAXID 2% în țesuturile periapicale și în țesuturile moi.
**CAȚION!** White rinsing root canals. use physiological saline between rinsing with sodium hypochlorite and chlorhexidine digluconate. It prevents the precipitation of a brown deposit.
Rincer copios.

**CONTRAINDICAȚIUNI**
Nu dozează produsul CHLORAXID 2% în țesuturile periapicale și în țesuturile moi.
**CAȚION!** White rinsing root canals. use physiological saline between rinsing with sodium hypochlorite and chlorhexidine digluconate. It prevents the precipitation of a brown deposit.
Rincer copios.

**CONTRAINDICAȚIUNI**
Nu dozează produsul CHLORAXID 2% în țesuturile periapicale și în țesuturile moi.
**CAȚION!** White rinsing root canals. use physiological saline between rinsing with sodium hypochlorite and chlorhexidine digluconate. It prevents the precipitation of a brown deposit.
Rincer copios.

**CONTRAINDICAȚIUNI**
Nu dozează produsul CHLORAXID 2% în țesuturile periapicale și în țesuturile moi.
**CAȚION!** White rinsing root canals. use physiological saline between rinsing with sodium hypochlorite and chlorhexidine digluconate. It prevents the precipitation of a brown deposit.
Rincer copios.

**CONTRAINDICAȚIUNI**
Nu dozează produsul CHLORAXID 2% în țesuturile periapicale și în țesuturile moi.
**CAȚION!** White rinsing root canals. use physiological saline between rinsing with sodium hypochlorite and chlorhexidine digluconate. It prevents the precipitation of a brown deposit.
Rincer copios.

**CONTRAINDICAȚIUNI**
Nu dozează produsul CHLORAXID 2% în țesuturile periapicale și în țesuturile moi.
**CAȚION!** White rinsing root canals. use physiological saline between rinsing with sodium hypochlorite and chlorhexidine digluconate. It prevents the precipitation of a brown deposit.
Rincer copios.

**CONTRAINDICAȚIUNI**
Nu dozează produsul CHLORAXID 2% în țesuturile periapicale și în țesuturile moi.
**CAȚION!** White rinsing root canals. use physiological saline between rinsing with sodium hypochlorite and chlorhexidine digluconate. It prevents the precipitation of a brown deposit.
Rincer copios.

**CONTRAINDICAȚIUNI**
Nu dozează produsul CHLORAXID 2% în țesuturile periapicale și în țesuturile moi.
**CAȚION!** White rinsing root canals. use physiological saline between rinsing with sodium hypochlorite and chlorhexidine digluconate. It prevents the precipitation of a brown deposit.
Rincer copios.

**CONTRAINDICAȚIUNI**
Nu dozează produsul CHLORAXID 2% în țesuturile periapicale și în țesuturile moi.
**CAȚION!** White rinsing root canals. use physiological saline between rinsing with sodium hypochlorite and chlorhexidine digluconate. It prevents the precipitation of a brown deposit.
Rincer copios.

**CONTRAINDICAȚIUNI**
Nu dozează produsul CHLORAXID 2% în țesuturile periapicale și în țesuturile moi.
**CAȚION!** White rinsing root canals. use physiological saline between rinsing with sodium hypochlorite and chlorhexidine digluconate. It prevents the precipitation of a brown deposit.
Rincer copios.

**CONTRAINDICAȚIUNI**
Nu dozează produsul CHLORAXID 2% în țesuturile periapicale și în țesuturile moi.
**CAȚION!** White rinsing root canals. use physiological saline between rinsing with sodium hypochlorite and chlorhexidine digluconate. It prevents the precipitation of a brown deposit.
Rincer copios.

**CONTRAINDICAȚIUNI**
Nu dozează produsul CHLORAXID 2% în țesuturile periapicale și în țesuturile moi.
**CAȚION!** White rinsing root canals. use physiological saline between rinsing with sodium hypochlorite and chlorhexidine digluconate. It prevents the precipitation of a brown deposit.
Rincer copios.

**CONTRAINDICAȚIUNI**
Nu dozează produsul CHLORAXID 2% în țesuturile periapicale și în țesuturile moi.
**CAȚION!** White rinsing root canals. use physiological saline between rinsing with sodium hypochlorite and chlorhexidine digluconate. It prevents the precipitation of a brown deposit.
Rincer copios.

**CONTRAINDICAȚIUNI**
Nu dozează produsul CHLORAXID 2% în țesuturile periapicale și în țesuturile moi.
**CAȚION!** White rinsing root canals. use physiological saline between rinsing with sodium hypochlorite and chlorhexidine digluconate. It prevents the precipitation of a brown deposit.
Rincer copios.

**CONTRAINDICAȚIUNI**
Nu dozează produsul CHLORAXID 2% în țesuturile periapicale și în țesuturile moi.
**CAȚION!** White rinsing root canals. use physiological saline between rinsing with sodium hypochlorite and chlorhexidine digluconate. It prevents the precipitation of a brown deposit.
Rincer copios.

**CONTRAINDICAȚIUNI**
Nu dozează produsul CHLORAXID 2% în țesuturile periapicale și în țesuturile moi.
**CAȚION!** White rinsing root canals. use physiological saline between rinsing with sodium hypochlorite and chlorhexidine digluconate. It prevents the precipitation of a brown deposit.
Rincer copios.

**CONTRAINDICAȚIUNI**
Nu dozează produsul CHLORAXID 2% în țesuturile periapicale și în țesuturile moi.
**CAȚION!** White rinsing root canals. use physiological saline between rinsing with sodium hypochlorite and chlorhexidine digluconate. It prevents the precipitation of a brown deposit.
Rincer copios.

**CONTRAINDICAȚIUNI**
Nu dozează produsul CHLORAXID 2% în țesuturile periapicale și în țesuturile moi.
**CAȚION!** White rinsing root canals. use physiological saline between rinsing with sodium hypochlorite and chlorhexidine digluconate. It prevents the precipitation of a brown deposit.
Rincer copios.

**CONTRAINDICAȚIUNI**
Nu dozează produsul CHLORAXID 2% în țesuturile periapicale și în țesuturile moi.
**CAȚION!** White rinsing root canals. use physiological saline between rinsing with sodium hypochlorite and chlorhexidine digluconate. It prevents the precipitation of a brown deposit.
Rincer copios.

**CONTRAINDICAȚIUNI**
Nu dozează produsul CHLORAXID 2% în țesuturile periapicale și în țesuturile moi.
**CAȚION!** White rinsing root canals. use physiological saline between rinsing with sodium hypochlorite and chlorhexidine digluconate. It prevents the precipitation of a brown deposit.
Rincer copios.

**CONTRAINDICAȚIUNI**
Nu dozează produsul CHLORAXID 2% în țesuturile periapicale și în țesuturile moi.
**CAȚION!** White rinsing root canals. use physiological saline between rinsing with sodium hypochlorite and chlorhexidine digluconate. It prevents the precipitation of a brown deposit.
Rincer copios.

**CONTRAINDICAȚIUNI**
Nu dozează produsul CHLORAXID 2% în țesuturile periapicale și în țesuturile moi.
**CAȚION!** White rinsing root canals. use physiological saline between rinsing with sodium hypochlorite and chlorhexidine digluconate. It prevents the precipitation of a brown deposit.
Rincer copios.

**CONTRAINDICAȚIUNI**
Nu dozează produsul CHLORAXID 2% în țesuturile periapicale și în țesuturile moi.
**CAȚION!** White rinsing root canals. use physiological saline between rinsing with sodium hypochlorite and chlorhexidine digluconate. It prevents the precipitation of a brown deposit.
Rincer copios.

**CONTRAINDICAȚIUNI**
Nu dozează produsul CHLORAXID 2% în țesuturile periapicale și în țesuturile moi.
**CAȚION!** White rinsing root canals. use physiological saline between rinsing with sodium hypochlorite and chlorhexidine digluconate. It prevents the precipitation of a brown deposit.
Rincer copios.

**CONTRAINDICAȚIUNI**
Nu dozează produsul CHLORAXID 2% în țesuturile periapicale și în țesuturile moi.
**CAȚION!** White rinsing root canals. use physiological saline between rinsing with sodium hypochlorite and chlorhexidine digluconate. It prevents the precipitation of a brown deposit.
Rincer copios.

**CONTRAINDICAȚIUNI**
Nu dozează produsul CHLORAXID 2% în țesuturile periapicale și în țesuturile moi.
**CAȚION!** White rinsing root canals. use physiological saline between rinsing with sodium hypochlorite and chlorhexidine digluconate. It prevents the precipitation of a brown deposit.
Rincer copios.

**CONTRAINDICAȚIUNI**
Nu dozează produsul CHLORAXID 2% în țesuturile periapicale și în țesuturile moi.
**CAȚION!** White rinsing root canals. use physiological saline between rinsing with sodium hypochlorite and chlorhexidine digluconate. It prevents the precipitation of a brown deposit.
Rincer copios.

**CONTRAINDICAȚIUNI**
Nu dozează produsul CHLORAXID 2% în țesuturile periapicale și în țesuturile moi.
**CAȚION!** White rinsing root canals. use physiological saline between rinsing with sodium hypochlorite and chlorhexidine digluconate. It prevents the precipitation of a brown deposit.
Rincer copios.

**CONTRAINDICAȚIUNI**
Nu dozează produsul CHLORAXID 2% în țesuturile periapicale și în țesuturile moi.
**CAȚION!** White rinsing root canals. use physiological saline between rinsing with sodium hypochlorite and chlorhexidine digluconate. It prevents the precipitation of a brown deposit.
Rincer copios.

**CONTRAINDICAȚIUNI**
Nu dozează produsul CHLORAXID 2% în țesuturile periapicale și în țesuturile moi.
**CAȚION!** White rinsing root canals. use physiological saline between rinsing with sodium hypochlorite and chlorhexidine digluconate. It prevents the precipitation of a brown deposit.
Rincer copios.

**CONTRAINDICAȚIUNI**
Nu dozează produsul CHLORAXID 2% în țesuturile periapicale și în țesuturile moi.
**CAȚION!** White rinsing root canals. use physiological saline between rinsing with sodium hypochlorite and chlorhexidine digluconate. It prevents the precipitation of a brown deposit.
Rincer copios.

**CONTRAINDICAȚIUNI**
Nu dozează produsul CHLORAXID 2% în țesuturile periapicale și în țesuturile moi.
**CAȚION!** White rinsing root canals. use physiological saline between rinsing with sodium hypochlorite and chlorhexidine digluconate. It prevents the precipitation of a brown deposit.
Rincer copios.

**CONTRAINDICAȚIUNI**
Nu dozează produsul CHLORAXID 2% în țesuturile periapicale și în țesuturile moi.
**CAȚION!** White rinsing root canals. use physiological saline between rinsing with sodium hypochlorite and chlorhexidine digluconate. It prevents the precipitation of a brown deposit.
Rincer copios.

**CONTRAINDICAȚIUNI**
Nu dozează produsul CHLORAXID 2% în țesuturile periapicale și în țesuturile moi.
**CAȚION!** White rinsing root canals. use physiological saline between rinsing with sodium hypochlorite and chlorhexidine digluconate. It prevents the precipitation of a brown deposit.
Rincer copios.

**CONTRAINDICAȚIUNI**
Nu dozează produsul CHLORAXID 2% în țesuturile periapicale și în țesuturile moi.
**CAȚION!** White rinsing root canals. use physiological saline between rinsing with sodium hypochlorite and chlorhexidine digluconate. It prevents the precipitation of a brown deposit.
Rincer copios.

**CONTRAINDICAȚIUNI**
Nu dozează produsul CHLORAXID 2% în țesuturile periapicale și în țesuturile moi.
**CAȚION!** White rinsing root canals. use physiological saline between rinsing with sodium hypochlorite and chlorhexidine digluconate. It prevents the precipitation of a brown deposit.
Rincer copios.

**CONTRAINDICAȚIUNI**
Nu dozează produsul CHLORAXID 2% în țesuturile periapicale și în țesuturile moi.
**CAȚION!** White rinsing root canals. use physiological saline between rinsing with sodium hypochlorite and chlorhexidine digluconate. It prevents the precipitation of a brown deposit.
Rincer copios.

**CONTRAINDICAȚIUNI**
Nu dozează produsul CHLORAXID 2% în țesuturile periapicale și în țesuturile moi.
**CAȚION!** White rinsing root canals. use physiological saline between rinsing with sodium hypochlorite and chlorhexidine digluconate. It prevents the precipitation of a brown deposit.
Rincer copios.

**CONTRAINDICAȚIUNI**
Nu dozează produsul CHLORAXID 2% în țesuturile periapicale și în țesuturile moi.
**CAȚION!** White rinsing root canals. use physiological saline between rinsing with sodium hypochlorite and chlorhexidine digluconate. It prevents the precipitation of a brown deposit.
Rincer copios.

**CONTRAINDICAȚIUNI**
Nu dozează produsul CHLORAXID 2% în țesuturile periapicale și în țesuturile moi.
**CAȚION!** White rinsing root canals. use physiological saline between rinsing with sodium hypochlorite and chlorhexidine digluconate. It prevents the precipitation of a brown deposit.
Rincer copios.

**CONTRAINDICAȚIUNI**
Nu dozează produsul CHLORAXID 2% în țesuturile periapicale și în țesuturile moi.
**CAȚION!** White rinsing root canals. use physiological saline between rinsing with sodium hypochlorite and chlorhexidine digluconate. It prevents the precipitation of a brown deposit.
Rincer copios.

**CONTRAINDICAȚIUNI**
Nu dozează produsul CHLORAXID 2% în țesuturile periapicale și în țesuturile moi.
**CAȚION!** White rinsing root canals. use physiological saline between rinsing with sodium hypochlorite and chlorhexidine digluconate. It prevents the precipitation of a brown deposit.
Rincer copios.

**CONTRAINDICAȚIUNI**
Nu dozează produsul CHLORAXID 2% în țesuturile periapicale și în țesuturile moi.
**CAȚION!** White rinsing root canals. use physiological saline between rinsing with sodium hypochlorite and chlorhexidine digluconate. It prevents the precipitation of a brown deposit.
Rincer copios.

**CONTRAINDICAȚIUNI**
Nu dozează produsul CHLORAXID 2% în țesuturile periapicale și în țesuturile moi.
**CAȚION!** White rinsing root canals. use physiological saline between rinsing with sodium hypochlorite and chlorhexidine digluconate. It prevents the precipitation of a brown deposit.
Rincer copios.

**CONTRAINDICAȚIUNI**
Nu dozează produsul CHLORAXID 2% în țesuturile periapicale și în țesuturile moi.
**CAȚION!** White rinsing root canals. use physiological saline between rinsing with sodium hypochlorite and chlorhexidine digluconate. It prevents the precipitation of a brown deposit.
Rincer copios.

**CONTRAINDICAȚIUNI**
Nu dozează produsul CHLORAXID 2% în țesuturile periapicale și în țesuturile moi.
**CAȚION!** White rinsing root canals. use physiological saline between rinsing with sodium hypochlorite and chlorhexidine digluconate. It prevents the precipitation of a brown deposit.
Rincer copios.

**CONTRAINDICAȚIUNI**
Nu dozează produsul CHLORAXID 2% în țesuturile periapicale și în țesuturile moi.
**CAȚION!** White rinsing root canals. use physiological saline between rinsing with sodium hypochlorite and chlorhexidine digluconate. It prevents the precipitation of a brown deposit.
Rincer copios.

**CONTRAINDICAȚIUNI**
Nu dozează produsul CHLORAXID 2% în țesuturile periapicale și în țesuturile moi.
**CAȚION!** White rinsing root canals. use physiological saline between rinsing with sodium hypochlorite and chlorhexidine digluconate. It prevents the precipitation of a brown deposit.
Rincer copios.

**CONTRAINDICAȚIUNI**
Nu dozează produsul CHLORAXID 2% în țesuturile periapicale și în țesuturile moi.
**CAȚION!** White rinsing root canals. use physiological saline between rinsing with sodium hypochlorite and chlorhexidine digluconate. It prevents the precipitation of a brown deposit.
Rincer copios.

**CONTRAINDICAȚIUNI**
Nu dozează produsul CHLORAXID 2% în țesuturile periapicale și în țesuturile moi.
**CAȚION!** White rinsing root canals. use physiological saline between rinsing with sodium hypochlorite and chlorhexidine digluconate. It prevents the precipitation of a brown deposit.
Rincer copios.

**CONTRAINDICAȚIUNI**
Nu dozează produsul CHLORAXID 2% în țesuturile periapicale și în țesuturile moi.
**CAȚION!** White rinsing root canals. use physiological saline between rinsing with sodium hypochlorite and chlorhexidine digluconate. It prevents the precipitation of a brown deposit.
Rincer copios.

**CONTRAINDICAȚIUNI**
Nu dozează produsul CHLORAXID 2% în țesuturile periapicale și în țesuturile moi.
**CAȚION!** White rinsing root canals. use physiological saline between rinsing with sodium hypochlorite and chlorhexidine digluconate. It prevents the precipitation of a brown deposit.
Rincer copios.

**CONTRAINDICAȚIUNI**
Nu dozează produsul CHLORAXID 2% în țesuturile periapicale și în țesuturile moi.
**CAȚION!** White rinsing root canals. use physiological saline between rinsing with sodium hypochlorite and chlorhexidine digluconate. It prevents the precipitation of a brown deposit.
Rincer copios.

**CONTRAINDICAȚIUNI**
Nu dozează produsul CHLORAXID 2% în țesuturile periapicale și în țesuturile moi.
**CAȚION!** White rinsing root canals. use physiological saline between rinsing with sodium hypochlorite and chlorhexidine digluconate. It prevents the precipitation of a brown deposit.
Rincer copios.

**CONTRAINDICAȚIUNI**
Nu dozează produsul CHLORAXID 2% în țesuturile periapicale și în țesuturile moi.
**CAȚION!** White rinsing root canals. use physiological saline between rinsing with sodium hypochlorite and chlorhexidine digluconate. It prevents the precipitation of a brown deposit.
Rincer copios.

**CONTRAINDICAȚIUNI**
Nu dozează produsul CHLORAXID 2% în țesuturile periapicale și în țesuturile moi.
**CAȚION!** White rinsing root canals. use physiological saline between rinsing with sodium hypochlorite and chlorhexidine digluconate. It prevents the precipitation of a brown deposit.
Rincer copios.

**CONTRAINDICAȚIUNI**
Nu dozează produsul CHLORAXID 2% în țesuturile periapicale și în țesuturile moi.
**CAȚION!** White rinsing root canals. use physiological saline between rinsing with sodium hypochlorite and chlorhexidine digluconate. It prevents the precipitation of a brown deposit.
Rincer copios.

**CONTRAINDICAȚIUNI**
Nu dozează produsul CHLORAXID 2% în țesuturile periapicale și în țesuturile moi.
**CAȚION!** White rinsing root canals. use physiological saline between rinsing with sodium hypochlorite and chlorhexidine digluconate. It prevents the precipitation of a brown deposit.
Rincer copios.

**CONTRAINDICAȚIUNI**
Nu dozează produsul CHLORAXID 2% în țesuturile periapicale și în țesuturile moi.
**CAȚION!** White rinsing root canals. use physiological saline between rinsing with sodium hypochlorite and chlorhexidine digluconate. It prevents the precipitation of a brown deposit.
Rincer copios.

**CONTRAINDICAȚIUNI**
Nu dozează produsul CHLORAXID 2% în țesuturile periapicale și în țesuturile moi.
**CAȚION!** White rinsing root canals. use physiological saline between rinsing with sodium hypochlorite and chlorhexidine digluconate. It prevents the precipitation of a brown deposit.
Rincer copios.

**CONTRAINDICAȚIUNI**
Nu dozează produsul CHLORAXID 2% în țesuturile periapicale și în țesuturile moi.
**CAȚION!** White rinsing root canals. use physiological saline between rinsing with sodium hypochlorite and chlorhexidine digluconate. It prevents the precipitation of a brown deposit.
Rincer copios.

**CONTRAINDICAȚIUNI**
Nu dozează produsul CHLORAXID 2% în țesuturile periapicale și în țesuturile moi.
**CAȚION!** White rinsing root canals. use physiological saline between rinsing with sodium hypochlorite and chlorhexidine digluconate. It prevents the precipitation of a brown deposit.
Rincer copios.

**CONTRAINDICAȚIUNI**
Nu dozează produsul CHLORAXID 2% în țesuturile periapicale și în țesuturile moi.

