

Gel voor wortelkanaalbehandeling

**NEMM VOOR GEBRUIK KENNIS VAN ONDERSTAANDE GEBRUIKSAANWIJZING
HET PRODUCT MAG UITSLUITEND WORDEN GEBRUIKT DOOR TANDARTSEN**SAMENSTELLING: chloorhexidinedigluconaat 2%, gelbasis.BESTEMMING

GLUCO-CHEX GEL 2% is bedoeld voor gebruik tijdens een wortelkanaalbehandeling. Het product ondersteunt de mechanische bewerking van wortelkanalen. Het hydrateert het wortelkanaal tijdens de mechanische bewerking, de glijstoffen uit het product vergemakkelijken het inbrengen van gereedschap in het wortelkanaal en minimaliseren de mogelijkheid dat het gereedschap in het wortelkanaal breekt.

GEBRUIKSAANWIJZING

Voordat u begint met de behandeling moet u de meegeleverde applicator onderdompelen in spiritus (ethylalcohol) en vervolgens op de spuit plaatsen. Breng het product in het wortelkanaal via het wortelkanaalinstrument of met behulp van de meegeleverde applicator, terwijl u tegelijkertijd het kanaal mechanisch bewerkt. Spoel het bewerkte wortelkanaal met een fysiologische zoutoplossing of gedestilleerd water.

Het product is bestemd voor meermalige toepassing; de applicator mag u slechts eenmaal gebruiken. Het meerdere malen gebruiken van de applicator kan risico op herinfectie met zich meebrengen.

CONTRA-INDICATIES

Niet gebruiken bij patiënten die overgevoelig zijn voor bestanddelen van het preparaat.

ATTENTIE! Niet gebruiken in combinatie met natriumhypochloriet, omdat dan moeilijk te verwijderen bruine neerslag kan ontstaan.

VEILIGHEIDSMATREGELEN

Bij het bewerken van het wortelkanaal in de buurt van de anatomische opening moet u bijzonder voorzichtig zijn, omdat het wortelkanaalinstrument perforatie van de wortel kan veroorzaken. Kan irritatie van mondslijmvlies en ogen veroorzaken. Bij contact afspoelen met water. Bij inslikken een grote hoeveelheid water drinken. Niet laten braken, een arts raadplegen.

BEWARING

Buiten bereik van kinderen bewaren. Bescherm het preparaat tegen de inwerking van zonnestraling. De uiterste gebruiksdatum bevindt zich op de primaire verpakking. Bewaar in de originele verpakking bij een temperatuur die lager is dan 25°C.

Na het openen van de verpakking verandert de uiterste gebruiksdatum niet, op voorwaarde dat u hem na ieder gebruik hermetisch afsluit.

VERWIJDERING VAN GEBRUIKTE VERPAKKINGEN

Gebruikte verpakkingen moet u aanbieden voor recycling of terugsturen naar de producent.

VERPAKKING

Spuit met 5 ml of 10 ml preparaat, dispenser, koppelstukje, eenmalige applicators.



PPH CERKAMED Wojciech Pawłowski
37-450 Stalowa Wola, Polska
ul. Kwiatkowskiego 1
Phone/fax 00 48 15 842 35 85