

Vloeistof voor het spoelen van wortelkanalen

**NEEM VOOR GEBRUIK KENNIS VAN ONDERSTAANDE GEBRUIKSAANWIJZING
HET PRODUCT MAG UITSLUITEND WORDEN GEBRUIKT DOOR TANDARTSEN**

SAMENSTELLING: chloorhexidinedigluconaat 2%, gezuiverd water volgens de farmacopee.

BESTEMMING

De vloeistof dient voor spoeling van de wortelkanalen om resten bewerkt weefsel te verwijderen. Ondersteunt de mechanische behandeling van wortelkanalen. Hydrateert het wortelkanaal tijdens de mechanische behandeling.

Adapter met dop om het preparaat in de spuit te brengen

1. Schroef de dop van het flesje los.
2. Schroef de adapter op het flesje.
3. Verwijder voor gebruik de blauwe dop, schroef het uiteinde van de spuit in de adapteropening, kantel het flesje met het preparaat ondersteboven en zuig de vloeistof in de spuit terwijl u de adapter vasthoudt. Zet het flesje vervolgens rechtop op het werkblad en draai de spuit met de vloeistof voorzichtig los van de adapter. We adviseren het gebruik van luer-locksputten met rubberen zuigers.
4. Beveiligt na ieder gebruik de adapter met de blauwe dop.
5. Voor transport verwijdert u de adapter en draait u het flesje dicht met de schroefdop.

GEBRUIKSAANWIJZING

Spuit het product met een naald met een zijopening in het wortelkanaal, terwijl u tegelijkertijd het kanaal mechanisch bewerkt. Spoel de wortelkanalen grondig uit met ca. 10 ml vloeistof per kanaal.

CONTRA-INDICATIES

Niet gebruiken bij patiënten die overgevoelig zijn voor bestanddelen van het preparaat.

ATTENTIE! Gebruik bij het spoelen van wortelkanalen een fysiologische zoutoplossing tussen het spoelen met natriumhypochloriet en chloorhexidinedigluconaat om bruine neerslag te voorkomen. Grondig uitspoelen.

VEILIGHEIDSMATREGELEN

Het gebruik van een rubberdam is tijdens het werk verplicht. Draag persoonlijke beschermingsmiddelen (bril, beschermmasker, handschoenen).

DE DISPENSER IS NIET BEDOELD VOOR DE OPSLAG VAN VLOEISTOFFEN!

BEWARING

Buiten bereik van kinderen bewaren. Bescherm het preparaat tegen de inwerking van zonnestraling. De uiterste gebruiksdatum bevindt zich op de primaire verpakking. Bewaar in de originele verpakking bij een temperatuur die lager is dan 25°C.

Na het openen van de verpakking verandert de uiterste gebruiksdatum niet, op voorwaarde dat u hem na ieder gebruik hermetisch afsluit.

VERWIJDERING VAN GEBRUIKTE VERPAKKINGEN

Gebruikte verpakkingen moet u aanbieden voor recycling of terugsturen naar de producent.

VERPAKKING

Flesje met 200 of 400 g preparaat, adapter met schroefdopje, dispenser.



PPH CERKAMED Wojciech Pawłowski
37-450 Stalowa Wola, Polska
ul. Kwiatkowskiego 1
Phone/fax 00 48 15 842 35 85